

Kemisk APV – Anders Andersens Rengøring

Navn på produkt	Dry-Cleaner
Anvendelse	Oliefjerner til rensning af elektriske komponenter, metaldele og glasfiber.
Faresymboler	
Brug af produktet	Påføres med pensel, børste eller klud. Aftørres med rene klude eller tryklufttørres.
Særlig fokus	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. (H304)
Efter brug	Vask altid hænderne efter udført arbejde! Der anbefales god håndhygiejne.
Affaldsbeholder/placering	Emballagen kan genanvendes. Skyl dunken med rent vand og brug skyllevandet til rengøring/afrensning. Streg eventuelle faremærke over inden emballagen sendes til genbrug.
Placering af slukningsudstyr	-
Placering af værnemidler	På rengøringsvogn
Anvendelse af værnemiddel: Handsker Hud og krop:	Engangshandske af Nitrile -
Beskyttelse af Øjne	Beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes.
Beskyttelse af åndedræt	Ved åndedrætsbesvær eller anden irritation af luftvejene: Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn.
Placering af øjenskyllevæske/øjenskyllestationer	På rengøringsvogn
Placering af førstehjælpsudstyr	I rengøringsrum
Førstehjælp:	
<p>Generelt: ved uheld: kontakt læge eller skadestue medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital. Tlf. 38 63 61 71. Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadedekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende.</p>	
<p>Indånding: Ved ubehag, bring personen i frisk luft.</p>	
<p>Hudkontakt:: Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes</p>	
<p>Øjenkontakt: fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand (20-30 C) indtil irritationen ophører og mindst i 5 min. Søg læge.</p>	
<p>Indtagelse: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTLINJEN / læge. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge eller ambulance. Symptomer på kemisk lungebetændelse kan vise sig efter adskillige timers forløb. Personer der har indtaget produktet bør derfor holdes under lægetilsyn i mindst 48 timer.</p>	
Udfyldt af og dato:	Morten Peytz mpe@aaren.dk 2022-04-13